

1. Спосіб лікування хворого з розладом сну шляхом введення хворому терапевтично ефективної кількості R-(+)- α -(2,3-диметоксифеніл)-1-[2-(4-фторфеніл)етил]-4-піперидинметанолу або його фармацевтично прийнятної солі.
2. Спосіб за п. 1, в якому розладом сну є безсоння.
3. Спосіб за п. 1, в якому розладом сну є обструктивне апное уві сні.
4. Спосіб за п. 1, в якому розладом сну є первинне безсоння.
5. Спосіб за п. 1, в якому розладом сну є безсоння, пов'язане з іншим психічним розладом.
6. Спосіб за п. 1, в якому розладом сну є безсоння, викликане речовиною.
7. Спосіб монотерапії хворого з розладом сну та іншим станом, вибраним з шизофренії, фіброміалгії, obsesивно-компульсивного розладу, коронарних вазоспазмів, тромботичного захворювання, стенокардії, нервової анорексії, феномену Рейно, екстрапірамідальних симптомів, тривоги, аритмій, депресивних розладів, біполярної депресії, який лікується за допомогою R-(+)- α -(2,3-диметоксифеніл)-1-[2-(4-фторфеніл)етил]-4-піперидинметанолу або його фармацевтично прийнятної солі шляхом введення хворому терапевтично ефективної кількості R-(+)- α -(2,3-диметоксифеніл)-1-[2-(4-фторфеніл)етил]-4-піперидинметанолу або його фармацевтично прийнятної солі.
8. Спосіб за п. 7, в якому розладом сну є безсоння.
9. Спосіб за п. 7, в якому розладом сну є обструктивне апное уві сні.
10. Спосіб за п. 7, в якому розладом сну є первинне безсоння.
11. Спосіб за п. 7, в якому розладом сну є безсоння, пов'язане з іншим психічним розладом.
12. Спосіб за п. 7, в якому розладом сну є безсоння, викликане речовиною.
13. Спосіб за п. 7, в якому станом є шизофренія.
14. Спосіб за п. 7, в якому станом є фіброміалгія.
15. Спосіб за п. 7, в якому станом є obsesивно-компульсивний розлад.
16. Спосіб за п. 7, в якому станом є коронарні вазоспазми.
17. Спосіб за п. 7, в якому станом є тромботичне захворювання.
18. Спосіб за п. 7, в якому станом є стенокардія.
19. Спосіб за п. 7, в якому станом є нервова анорексія.
20. Спосіб за п. 7, в якому станом є феномен Рейно.
21. Спосіб за п. 7, в якому станом є екстрапірамідальні симптоми.
22. Спосіб за п. 7, в якому станом є тривога.
23. Спосіб за п. 7, в якому станом є аритмії.
24. Спосіб за п. 7, в якому станом є депресивні розлади.
25. Спосіб за п. 7, в якому станом є біполярна депресія.

26. Спосіб за п. 7, в якому станом є шизофренія і розладом сну є безсоння.
27. Спосіб за п. 7, в якому станом є шизофренія і розладом сну є обструктивне апное уві сні.
28. Спосіб за п. 7, в якому станом є шизофренія і розладом сну є первинне безсоння.
29. Спосіб за п. 7, в якому станом є шизофренія і розладом сну є безсоння, пов'язане з іншим психічним розладом.
30. Спосіб за п. 7, в якому станом є шизофренія і розладом сну є безсоння, викликане речовиною.