

1. Застосування ET743 при одержанні лікарського засобу для лікування організму людини від раку, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу, прийнятного для внутрішньовенного введення в дозі від 500 до 1650 мікрограм на м².

2. Застосування за п. 1, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу для циклів внутрішньовенного введення з інтервалами від 1 до 6 тижнів.

3. Застосування за п. 1, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу для введення з тривалістю вливання до 72 годин.

4. Застосування за п. 1, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу для введення з тривалістю вливання від 2 до 24 год.

5. Застосування за п. 1, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу для введення з тривалістю вливання близько 3 годин.

6. Застосування за п. 1, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу для введення з тривалістю вливання близько 24 годин.

7. Застосування за п. 1, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу для введення з інтервалом в 1 тиждень.

8. Застосування за п. 2, за яким пацієнтам дають можливість набратись сили для повторення циклу.

9. Застосування за п. 2, де цикл складає 3 або 4 тижні.

10. Застосування за п.1, де рак являє собою меланому, лейоміосаркому, стромальну саркому товстої кишки, стромальну саркому шлунка, остеосаркому, ліпосаркому, рак молочної залози, рак яєчника, мезотеліому або очну меланому.

11. Застосування за п. 1, де рак метастазований.

12. Застосування за п. 1, де людина вже піддавалася раніше лікуванню раку хіміотерапією.

13. Застосування за п. 1, де лікарським засобом є протиблювотний засіб.

14. Застосування ET743 при одержанні лікарського засобу для лікування людини, що страждає від раку, за допомогою комбінованої терапії, що включає введення ET743 і дексаметазону.

15. Спосіб лікування людини від раку, який полягає у внутрішньовенному введенні ET743 в дозі від 1000 до 1500 мікрограм на м² поверхні організму з тривалістю вливання протягом 24 годин кожні 3-4 тижні.

16. Застосування ET743 при одержанні лікарського засобу для лікування людини від раку, де ET743 представлений у вигляді лікарського засобу, прийнятного для внутрішньовенного введення в дозі від 1000 до 1650 мікрограм на м² поверхні організму з тривалістю вливання протягом 3 годин у вигляді багатократних циклів по 3-4 тижні кожний і при однократному введенні лікарського засобу в перший день кожного циклу.

