

1. Водний розчин, призначений для місцевого застосування, для лікування пізньої фази реакції при алергічному риніті або кон'юктивіті, який містить:
 - а) епінастин як активну речовину, необов'язково у вигляді його рацемату, його енантіомерів, а також необов'язково у вигляді його фармакологічно прийнятних кислотно-адитивних солей, з концентрацією від 0,0005 до 0,1 мас. %,
 - б) воду або фізіологічний розчин кухонної солі як розчинник,
 - в) буфер для встановлення значення рН від 6,5 до 7,2, необов'язково з додаванням гідроксиду натрію,
 - г) консервант,та необов'язково
 - д) хелатоутворювальні засоби,
 - е) в'язучі засоби,
 - є) підсилювачі penetрації,
 - ж) антиоксиданти,
 - з) і/або фізіологічно сумісні засоби для надання тонічності розчину.
2. Розчин за п. 1, який **відрізняється** тим, що діючою речовиною є гідрохлорид епінастину.
3. Розчин за п. 1 або п. 2, який **відрізняється** тим, що в'язучий засіб вибирають із групи, яка включає полівініловий спирт, повідон, гідроксипропілметилцелюлозу, полоксамери, карбоксиметилцелюлозу, карбомер та гідроксіетилцелюлозу.
4. Розчин за будь-яким з пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що консервант вибирають із групи, яка включає бензалконійхлорид, хлорбутанол, тимерозал, фенілртутьацетат та фенілртутьнітрат.
5. Розчин за будь-яким з пп. 1-4, який **відрізняється** тим, що підсилювач penetрації вибирають із групи, яка включає диметилсульфоксид, диметилацетамід, піролідон, пропіленгліколь, пропіленкарбонат та олеїнову кислоту.
6. Розчин за будь-яким з пп. 1-5, який **відрізняється** тим, що засіб для надання тонічності вибирають із групи, яка включає хлористий натрій, хлористий калій, маніт та гліцерин.
7. Розчин за будь-яким з пп. 1-6, який **відрізняється** тим, що буфер вибирають із групи, яка включає ацетатний буфер, цитратний буфер, фосфатний буфер та боратний буфер.
8. Розчин за будь-яким з пп. 1-7, який **відрізняється** тим, що антиоксидантний засіб вибирають із групи, яка включає метабісульфіт натрію, тіосульфат натрію, ацетилцистеїн, бутиловий гідроксіанізол та бутиловий гідрокситолуол.
9. Розчин за будь-яким з пп. 1-8, який **відрізняється** тим, що хелатоутворювальним засобом є динатрійедетат.

10. Розчин за будь-яким з пп.1-9 який **відрізняється** тим, що містить гідрохлорид епінастину як активну речовину в кількості від 0,05 до 0,1 мас. %.
11. Розчин за будь-яким з пп.1-10, який **відрізняється** тим, що містить як розчинник воду, гідрохлорид епінастину, хлористий натрій, дигідрат гідрофосфату натрію, бензалконійхлорид, гідроксіетилцелюлозу та необов'язково натрій-ЕДТК і гідроксид натрію.
12. Розчин за будь-яким з пп.1-11, який **відрізняється** тим, що його застосовують для виготовлення препаратів для лікування пізньої фази реакції при алергічному риніті або кон'юктивіті.