

1. Застосування ентекавіру для одержання фармацевтичної композиції у формі таблетки або капсули для перорального введення один раз на добу з метою лікування інфікування вірусом гепатиту В у дорослого пацієнта-людини, яке відрізняється тим, що вказана композиція містить від 0,5 мг до 1,0 мг ентекавіру, прикріпленого до поверхні фармацевтично прийнятного субстрату.
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що вказаний ентекавір присутній в кількості 0,5 мг.
3. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що вказаний ентекавір присутній в кількості 1,0 мг.
4. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що вказана композиція містить одну або більше інших фармацевтично активних субстанцій.
5. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що вказаний субстрат носія вибраний з лактози, мікрокристалічної целюлози, кальцію фосфату, декстрину, глюкози, декстратів, маніту, сорбіту і сахарози або їх суміші, та вказаний ентекавір прикріплений до вказаного субстрату за допомогою адгезивної субстанції, що має достатню клейкість.
6. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що вказана клейка субстанція вибрана з повідону, метилцелюлози, гідроксиметилцелюлози, гідроксипропілметилцелюлози, гідроксипропілцелюлози, гідроксіетилцелюлози, желатину, гуарової камеді та ксантанової камеді або їх суміші.
7. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що вказана композиція містить змащувальну речовину і дезінтегрант, де вказана змащувальна речовина вибрана з магнію стеарату, стеаринової кислоти, натрію стеарилфумарату і натрію лаурилсульфату, а вказаний дезінтегрант вибраний з кросповідону, натрію кроскармелози, натрію крохмаль гліколяту, прежелатинізованого крохмалю та кукурудзяного крохмалю або їх сумішей.

8. Застосування ентекавіру для одержання фармацевтичної композиції у формі таблетки загальною масою 100 мг, яке відрізняється тим, що вказана композиція таблетки ентекавіру містить:

0,5 % ентекавіру

60,00 % лактози моногідрату,

32,50 % мікрокристалічної целюлози,

4,0 % кросповідону,

2,50 % повідону, і

0,50 % магнію стеарату, де вказані відсотки наведені на базі мас./мас.,

або

1,0 % ентекавіру,

90,0 % маніту,

4,0 % натрію кроскармелози,

2,50 % метилцелюлози, і

2,50 % стеаринової кислоти, де вказані відсотки наведені на базі мас./мас.