

1. Гомеопатичний підбір для лікування алкогольної залежності, до складу якого входять протилежні гомеопатичні комплекси, що містять зокрема *Nux vomica* та *Opium*, який **відрізняється** тим, що складається з чотирьох гомеопатичних комплексів А, В, С, D, які мають наступний склад:

комплекс А:

Acidum sulfuricum CH 30, 50, 200 x 3, 6, 12

Acidum phosphoricum CH 30, 50, 200 x 3, 6, 12

Selenium metallicum CH 30, 50 x 3, 6 і вище

Staphysagria CH 6, 30, 50, 200 x 3, 6, 30

Nux vomica CH 6, 30, 50, 200, 1000 x 3, 6, 12, 30

Arsenicum album CH 30, 50, 200, 1000, 5000, 8000, 10000 x 3, 6, 12, 15, 30 і вище;

комплекс В:

Opium CH 30, 50, 200, 1000 x 3, 6, 12

Aurum metallicum CH 50, 200, 1000 x 3, 6, 12, 30 і вище

Sulfur CH 6, 30, 50, 200, 1000, 5000, 8000, 10000 x 3, 6, 12, 15, 30

Lachesis mutus CH 200, 1000 x 6, 12, 15, 30;

комплекс С:

China CH 6, 50, 200, 500 x 2, 3, 6, 12, 15, 30 і вище

Carbo vegetabilis CH 30, 50, 200 x 3, 6, 12 і вище

Ranunculus bulbosus CH 6, 30, 50, 200 x 3, 6;

комплекс D:

Sepia officinalis CH 50, 200 x 3, 6, 12, 30

Caicaria carbonica CH 30, 50 x 3, 6, 12

Rhus toxicodendron CH 6, 30, 50, 200, 1000 x 3, 6, 12

Bellodonna CH 6, 30, 50, 200, 1000 x 3, 6, 12.

2. Спосіб лікування алкогольної залежності із застосуванням гомеопатичного підбору, до складу якого входять протилежні гомеопатичні комплекси, що передбачає почергове застосування протилежних гомеопатичних комплексів, який **відрізняється** тим, що застосовують гомеопатичний підбір за п. 1.

3. Спосіб за п. 2, який **відрізняється** тим, що лікування проводять не менш ніж двома послідовними курсами, для яких серед наведених гомеопатичних комплексів вибирають один як базовий препарат для першого курсу і один як препарат вибору.

4. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що базовий препарат для першого курсу і препарат вибору вибирають в залежності від статі, віку, конституційного типу, схильності до психозів та ступеня алкогольної залежності пацієнта.

5. Спосіб за п. 3 або п. 4, який **відрізняється** тим, що базовий препарат застосовують протягом 1,5-2 місяців дозою 7-15 гранул щоденно за 20 хвилин до прийняття їжі шляхом розсмоктування під язиком або додаючи до води в кількості до 100 мл, що її має випити пацієнт дрібними ковтками.

6. Спосіб за п. 3 або п. 4, або п. 5, який **відрізняється** тим, що після проведення першого курсу лікування здійснюють оцінку динаміки лікувального процесу за зміною симптомів захворювання, за результатами якої вибирають новий базовий препарат і препарат вибору для подальших курсів лікування.

7. Спосіб за п. 6, який **відрізняється** тим, що базовий препарат і препарат вибору для другого курсу вибирають в залежності від статі, віку, конституційного типу, схильності до психозів та ступеня алкогольної залежності пацієнта.

8. Спосіб за п. 6 або 7, який **відрізняється** тим, що за відсутності особливих змін після першого курсу лікування як другий базовий препарат вибирають інший гомеопатичний комплекс, а первинно вибраний базовий препарат повністю виключають зі схеми лікування

пацієнта.

9. Спосіб за п. 8, який **відрізняється** тим, що за відсутності особливих змін після лікування другим базовим препаратом протягом 1,5-2 місяців як третій базовий препарат вибирають гомеопатичний комплекс, який раніше не використовувався, а другий базовий препарат повністю виключають зі схеми лікування пацієнта.

10. Спосіб за п. 6 або 7, який **відрізняється** тим, що за помірних змін після першого курсу лікування як другий базовий препарат використовують гомеопатичний комплекс, первинно обраний як препарат вибору.

11. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що за вираженої позитивної динаміки лікувального процесу здійснюють курс лікування первинно вибраним базовим препаратом.

12. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що за вираженої позитивної динаміки лікування подальше лікування здійснюють, чергуючи первинно вибрані базовий препарат і препарат вибору.

13. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що за мало вираженої динаміки лікувального процесу подальше лікування здійснюють первинно вибраним базовим препаратом, після чого проводять курс лікування препаратом вибору, що не співпадає з первинно вибраним препаратом вибору, який повністю виключається з подальшого лікування.

14. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що за вираженої позитивної динаміки лікувального процесу подальше лікування здійснюють первинно вибраним базовим препаратом з корекцією дози та частоти прийому протягом 6 місяців з консультативним контролем лікаря.

15. Спосіб за п. 14, який **відрізняється** тим, що кратність прийому зменшують до 1 разу на день по 7-10 гранул.