

1. Застосування есциталопраму, що містить менше ніж 3 мас. % R-циталопраму, для приготування фармацевтичної композиції, призначеної для лікування помірної або сильної депресії.
2. Застосування за п. 1, яке відрізняється тим, що есциталопрам використовується для приготування фармацевтичної композиції для лікування сильної депресії.
3. Застосування за п. 1 або 2, яке відрізняється тим, що есциталопрам використовується у вигляді оксалатної солі, переважно кристалічної оксалатної солі.
4. Застосування за будь-яким з пп. 1 - 3, яке відрізняється тим, що використовуваний есциталопрам містить не більше 2 мас. % R-циталопраму.
5. Застосування за п. 4, яке відрізняється тим, що есциталопрам містить не більше 1 мас. % R-циталопраму.
6. Застосування за будь-яким з пп. 1 - 5, яке відрізняється тим, що фармацевтична композиція призначена для лікування один раз на добу серйозного депресивного розладу, при цьому фармацевтична композиція є стандартною дозою, що містить менше 10 мг есциталопраму.
7. Застосування есциталопраму за п. 6, яке відрізняється тим, що фармацевтична композиція є стандартною дозою, що містить 7,5 мг або менше есциталопраму.
8. Застосування есциталопраму за п. 7, яке відрізняється тим, що фармацевтична композиція є стандартною дозою, що містить 5,0 мг есциталопраму.