

1. Застосування інгібітора ароматази - похідної триазолу - для виготовлення лікарського засобу для індукування овуляції у пацієнтки, що страждає на ановуляторну неплідність, який вводять в організм пацієнтки в один з днів 1-5 менструального циклу у вигляді разової дози щонайменше одного такого інгібітора ароматази, яка спричиняє зниження рівнів естрадіолу в сироватці крові.
2. Застосування за п. 1, причому разова доза інгібітора ароматази становить від приблизно 5 мг до приблизно 500 мг, у варіанті, якому віддається перевага, - 5 мг, 10 мг, 20 мг, 25 мг або 30 мг.
3. Застосування за п. 1, причому інгібітором ароматази є:
 - летрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг;
 - анастрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг, у варіанті, якому віддається перевага, - від приблизно 5 мг до приблизно 50 мг; або
 - ворозол, і його разова доза становить від приблизно 10 мг до приблизно 200 мг або від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг.
4. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, причому інгібітор ароматази вибраний з інгібіторів ароматази, які мають період напіввиведення від приблизно 8 год. до приблизно 4 діб, у варіанті, якому віддається перевага, - приблизно 2 доби.
5. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, причому інгібітор ароматази вибраний з нестероїдних та оборотних інгібіторів ароматази.
6. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, причому інгібітор ароматази є таким, що може вводитися перорально.
7. Застосування за будь-яким із попередніх пунктів, причому кількість інгібітора ароматази вибирають з кількостей, які забезпечують зниження рівнів естрогену в організмі пацієнтки до значень, характерних для постклімактеричного періоду, у варіанті, якому віддається перевага,
 - до приблизно 100 пмоль/л або нижче при вимірюванні стандартними способами імунохімічного аналізу.
8. Застосування за будь-яким із пп. 1-7, причому згаданий лікарський засіб вводять в організм на 3-й день менструального циклу.
9. Застосування інгібітора ароматази - похідної триазолу - для виготовлення лікарського засобу для посилення овуляції у пацієнтки з діючою овуляторною функцією, що страждає на неплідність нез'ясованого походження або на інший тип овуляторної неплідності, який вводять в організм пацієнтки в один з днів 1-5 одного або кількох менструальних циклів у вигляді разової дози щонайменше одного такого інгібітора ароматази, яка спричиняє

зниження рівнів естрадіолу в сироватці крові.

10. Застосування за п. 9, причому разова доза інгібітора ароматази становить від приблизно 5 мг до приблизно 500 мг, у варіанті, якому віддається перевага, - 5 мг, 10 мг, 20 мг, 25 мг або 30 мг.

11. Застосування за п. 9, причому інгібітором ароматази є:

- летрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг;

- анастрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг, у варіанті, якому віддається перевага, - від приблизно 5 мг до приблизно 50 мг; або

- ворозол, і його разова доза становить від приблизно 10 мг до приблизно 200 мг або від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг.

12. Застосування за будь-яким із пп. 9-11, причому інгібітор ароматази вибраний з інгібіторів ароматази, які мають період напіввиведення від приблизно 8 год. до приблизно 4 діб, у варіанті, якому віддається перевага, - приблизно 2 доби.

13. Застосування за будь-яким із пп. 9-12, причому інгібітор ароматази вибраний з нестероїдних та оборотних інгібіторів ароматази.

14. Застосування за будь-яким із пп. 9-13, причому інгібітор ароматази є таким, що може вводитися перорально.

15. Застосування за будь-яким із пп. 9-14, причому кількість інгібітора ароматази вибирають з кількостей, які забезпечують зниження рівнів естрогену в організмі пацієнтки до значень, характерних для постклімактеричного періоду, у варіанті, якому віддається перевага, - до приблизно 100 пмоль/л або нижче при вимірюванні стандартними способами імунохімічного аналізу.

16. Застосування за будь-яким із пп. 9-15, причому згаданий лікарський засіб вводять в організм на 3-й день менструального циклу.

17. Застосування інгібітора ароматази - похідної триазолу - для виготовлення лікарського засобу для застосування в комбінації з фолікулостимулювальним гормоном (FSH) для лікування від неплідності пацієнтки, що страждає на ановуляторну неплідність, причому такого лікарського засобу, який вводять в організм згаданої пацієнтки в один з днів 1-5 менструального циклу у вигляді разової дози такого інгібітора ароматази, яка спричиняє зниження рівнів естрадіолу в сироватці крові.

18. Застосування за п. 17, причому дози інгібітора ароматази та FSH вводять в організм одночасно, окремо або послідовно.

19. Застосування за п. 17, причому інгібітором ароматази є:

- летрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг;
- анастрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг, у варіанті, якому віддається перевага, - від приблизно 5 мг до приблизно 50 мг; або
- ворозол, і його разова доза становить від приблизно 10 мг до приблизно 200 мг або від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг.

20. Застосування за будь-яким із пп. 17 або 18, причому разова доза інгібітора ароматази становить від приблизно 5 мг до приблизно 500 мг, у варіанті, якому віддається перевага, - 5 мг, 10 мг, 20 мг, 25 мг або 30 мг, а добові дози фолікулостимулювального гормону становлять від приблизно 25 одиниць до приблизно 600 одиниць, або він вводиться в еквівалентних дозах при іншій формі застосування.

21. Застосування за будь-яким із пп. 17-20, причому інгібітором ароматази є:

- летрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг;
- анастрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг; або
- ворозол, і його разова доза становить від приблизно 10 мг до приблизно 200 мг або від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг;

а добові дози фолікулостимулювального гормону становлять від приблизно 25 одиниць до приблизно 600 одиниць, або він вводиться в еквівалентних дозах при іншій формі застосування.

22. Застосування за будь-яким з пп. 17-21, причому інгібітор ароматази вибраний з інгібіторів ароматази, які мають період напіввиведення від приблизно 8 год. до приблизно 4 діб, у варіанті, якому віддається перевага, - приблизно 2 доби.

23. Застосування за будь-яким із пп. 17-22, причому інгібітор ароматази вибраний з нестероїдних та оборотних інгібіторів ароматази.

24. Застосування за будь-яким із пп. 17-23, причому інгібітор ароматази є таким, що може вводитися перорально.

25. Застосування за будь-яким із пп. 17-24, причому кількість інгібітора ароматази вибирають з кількостей, які забезпечують зниження рівнів естрогену в організмі пацієнтки до значень, характерних для постклімактеричного періоду, у варіанті, якому віддається перевага, - до приблизно 100 пмоль/л або нижче при вимірюванні стандартними способами імунохімічного аналізу.

26. Застосування за будь-яким із пп. 17-25, причому згаданий лікарський засіб вводять в організм на 3-й день менструального циклу.

27. Застосування разової дози інгібітора ароматази - похідної триазолу - для виготовлення

лікарського засобу для застосування в комбінації з фолікулостимулювальним гормоном (FSH) при лікуванні від неплідності пацієнтки зі слабкою реакцією на FSH, причому такого лікарського засобу, який уводять в організм згаданої пацієнтки в один з днів 1-5 менструального циклу разовою дозою, яка спричиняє зниження рівнів естрадіолу в сироватці крові

28. Застосування за п. 27, причому дози інгібітора ароматази та FSH уводять в організм одночасно, окремо або послідовно.

29. Застосування за п. 27 або 28, причому разова доза інгібітора ароматази становить від приблизно 5 мг до приблизно 500 мг, у варіанті, якому віддається перевага, - 5 мг, 10 мг, 20 мг, 25 мг або 30 мг, а добові дози фолікулостимулювального гормону становлять від приблизно 25 одиниць до приблизно 600 одиниць, або він вводиться в еквівалентних дозах при іншій формі застосування.

30. Застосування за будь-яким із пп. 27, 28 та 29, причому інгібітором ароматази є:

- летрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг;
- анастрозол, і його разова доза становить від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг; або
- ворозол, і його разова доза становить від приблизно 10 мг до приблизно 200 мг або від приблизно 5 мг до приблизно 100 мг;

а добові дози фолікулостимулювального гормону становлять від приблизно 25 одиниць до приблизно 600 одиниць, або він вводиться в еквівалентних дозах при іншій формі застосування.

31. Застосування за будь-яким із пп. 27-30, причому інгібітор ароматази вибраний з інгібіторів ароматази, які мають період напіввиведення від приблизно 8 год. до приблизно 4 діб, у варіанті, якому віддається перевага, - приблизно 2 доби.

32. Застосування за будь-яким із пп. 27-31, причому інгібітор ароматази вибраний з нестероїдних та оборотних інгібіторів ароматази.

33. Застосування за будь-яким із пп. 27-32, причому інгібітор ароматази є таким, що може вводитися перорально.

34. Застосування за будь-яким із пп. 27-33, причому кількість інгібітора ароматази вибирають з кількостей, які забезпечують зниження рівнів естрогену в організмі пацієнтки до значень, характерних для постклімактеричного періоду, у варіанті, якому віддається перевага, - до приблизно 100 пмоль/л або нижче при вимірюванні стандартними способами імунохімічного аналізу.

35. Застосування за будь-яким із пп. 27-34, причому згаданий лікарський засіб уводять в

організм на 3-й день менструального циклу.

36. Комплект для лікування неплідності у пацієнтки, який включає в себе одне (або одну, або один) драже, таблетку, капсулу, супозиторій, контейнер для доставки, розчин для ін'єкції, суспензію для ін'єкції, що містить інгібітор ароматази - похідну триазолу - разом із фармацевтично прийнятним носієм, а також одне (або одну, або один) або декілька драже, таблеток, капсул, супозиторіїв, контейнерів для доставки, розчинів для ін'єкції, суспензій для ін'єкції, що містять фолікулостимулювальний гормон разом із фармацевтично прийнятним носієм.