

1. Застосування людського хоріонічного гонадотропіну (hCG) або його аналога для виготовлення лікарського засобу для застосування у поєднанні із регульованою гіперстимуляцією яєчників (СОН) у пацієнтів-людей, яка передбачає застосування FSH або його аналога, для сприяння імплантації та/або зменшення частоти викиднів, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається починати не пізніше восьмого дня після початку лікування гормоном FSH і з дозою 25-1000 МОд hCG на добу.

2. Застосування за п. 1, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається починати з третього по восьмий день після початку лікування гормоном FSH.

3. Застосування за п. 1 або 2, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається починати на сьомий або восьмий день після початку лікування гормоном FSH.

4. Застосування за будь-яким із пп. 1-3, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається із дозою 50-100 МОд hCG на добу.

5. Застосування за будь-яким із пп. 1-4, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається здійснювати разовою ударною дозою.

6. Застосування за п. 5, причому передбачається введення разової ударної дози на сьомий або восьмий день після початку лікування гормоном FSH, і ударна доза містить 100-500 МОд hCG.

7. Застосування за будь-яким із пп. 1-6, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається здійснювати щодоби, до індукування овуляції.

8. Застосування за будь-яким із пп. 1-7, причому передбачається здійснення СОН у поєднанні із заплідненням *in vitro* або заплідненням *in vivo*.

9. Застосування за будь-яким із пп. 1-8, причому згадані пацієнти страждають на низькі рівні ендогенного LH.

10. Застосування за будь-яким із пп. 1-9, причому згадані пацієнти є такими, що попередньо зазнали невдачі із настанням або збереженням вагітності при застосуванні лише FSH.

11. Застосування за будь-яким із пп. 1-10, причому hCG є рекомбінантним hCG.

12. Застосування за будь-яким із пп. 1-10, причому hCG є сечовим hCG.

13. Застосування за будь-яким із пп. 1-10, причому застосовується аналог hCG, і ним є одноланцюговий hCG.

14. Застосування людського хоріонічного гонадотропіну (hCG) або його аналога для виготовлення лікарського засобу для стимулювання імплантації та/або зменшення частоти викиднів ембріонів у пацієнта-людини, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається перед овуляцією або запуском механізму овуляції і з дозою 25-1000 МОд hCG на добу.

15. Застосування за п. 14, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається здійснювати на сьомий або восьмий день після менструації у вигляді разової ударної дози.

16. Застосування за п. 14, причому введення згаданого лікарського засобу передбачається здійснювати щодобово, починаючи на сьомий або восьмий день після менструації і продовжуючи до відбуття овуляції.

17. Застосування за будь-яким із пп. 14-16, причому hCG відповідає визначенню, наведеному у будь-якому з пп. 11-13.

18. Застосування за будь-яким із пп. 1-13, причому застосовують аналог FSH, яким є FSH-СТР, інгібітор ароматази або кломіфену цитрат.