

1. Застосування амброксолу або однієї з його фармакологічно прийнятних солей як діючої речовини з безпечною дією, яка проявляється протягом принаймні 3-х годин після прийому, для лікування болю у порожнині рота і/або глотки, причому амброксол застосовують місцево у разовій дозі, яка містить від 15 до 50 мг амброксолу.
2. Застосування за п. 1, яке **відрізняється** тим, що амброксол або одну з його фармакологічно прийнятних солей застосовують разом з однією або декількома речовинами, вибраними із групи, яка включає антисептики, вітаміни, кортикостероїди, протизапальні засоби, антибіотики, протигрибкові засоби і протеолітичні ферменти.
3. Застосування за п. 1, яке **відрізняється** тим, що амброксол або одну з його фармакологічно прийнятних солей застосовують разом з однією або декількома речовинами, вибраними із групи, яка включає лізоциму гідрохлорид, дикалію гліцирризинат, амонію гліцирризинат, цетилпіридинію хлорид, хлорфеніраміну малеат, носкапін, деквалінію хлорид, декстрометорфану фенолфталінат, калію гуайяколсульфонат, dl-метилефедрину гідрохлорид, хлоргексидину гідрохлорид і калію крезолсульфонат.
4. Застосування за п. 1, яке **відрізняється** тим, що амброксол або одну з його фармакологічно прийнятних солей застосовують разом з бромгексином або однією з його фармакологічно прийнятних солей і фармацевтичними допоміжними речовинами.
5. Застосування за будь-яким з пп. 2-4, яке **відрізняється** тим, що амброксол застосовують у вигляді твердої лікарської форми, призначеної для смоктання.
6. Застосування за будь-яким з пп. 2-4, яке **відрізняється** тим, що амброксол застосовують у вигляді напівтвердої лікарської форми у вигляді гелю.