

1. Спосіб лікування або інгібування втрати кісткової тканини у ссавця, що потребує цього, який включає введення ефективної кількості базедоксифену відповідно до режиму з тривалими інтервалами, де вказаний режим введення з тривалими інтервалами являє собою режим із введенням у межах від кожного другого дня (через день) до одного разу на тиждень.
2. Спосіб за пунктом 1, в якому базедоксифен є ацетатом базедоксифену.
3. Спосіб за пунктом 2, в якому базедоксифен вводять один раз на тиждень.
4. Спосіб за пунктом 2, в якому базедоксифен вводять через день.
5. Спосіб лікування або інгібування остеопорозу у ссавця, який потребує цього, що включає введення ефективної кількості базедоксифену згідно з режимом з тривалими інтервалами, де вказаний режим введення з тривалими інтервалами являє собою режим із введенням у межах від кожного другого дня (через день) до одного разу на тиждень.
6. Спосіб за пунктом 5, в якому базедоксифен є ацетатом базедоксифену.
7. Спосіб за пунктом 6, в якому базедоксифен вводять один раз на тиждень.
8. Спосіб за пунктом 6, в якому базедоксифен вводять кожного другого дня.
9. Застосування базедоксифену для виготовлення лікарського препарату для лікування або інгібування втрати кісткової тканини у ссавця, причому вказаний лікарський препарат адаптований для введення в режимі з тривалими інтервалами, де вказаний режим введення з тривалими інтервалами являє собою режим із введенням у межах від кожного другого дня (через день) до одного разу на тиждень.
10. Застосування базедоксифену для виготовлення лікарського препарату для лікування або інгібування остеопорозу у ссавця, причому вказаний лікарський препарат адаптований для введення в режимі з тривалими інтервалами, де вказаний режим введення з тривалими інтервалами являє собою режим із введенням у межах від кожного другого дня (через день) до одного разу на тиждень.

11. Застосування за будь-яким з пунктів 9 або 10, причому базедоксифен є ацетатом базедоксифену.
12. Застосування за будь-яким з пунктів 9-11, причому лікарський препарат адаптований для введення ссавцеві одного разу кожні два дні, кожні три дні, кожні чотири дні, кожні п'ять днів, кожні шість днів або кожні сім днів.
13. Застосування за будь-яким з пунктів з 9 по 12, причому лікарський препарат адаптований для введення один раз на тиждень.
14. Застосування за будь-яким з пунктів з 9 по 12, причому лікарський препарат адаптований для введення через день.