

1. Спосіб пластики передньої третини верхньої стрілової пазухи трансплантатом із підшкірної вени верхньої кінцівки, який включає використання ізолюваного аутовенозного трансплантата, який **відрізняється** тим, що формують сегмент із головної або основної вени у верхній частині плечової ділянки, що відповідає довжині та діаметру вказаного венозного колектора.
2. Спосіб пластики передньої третини верхньої стрілової пазухи трансплантатом із підшкірної вени верхньої кінцівки за п. 1, який **відрізняється** тим, що з'єднання аутовенозного трансплантата зі стінками пазухи виконують за допомогою трьох лігатурних держаків, які розташовані у місцях переходу лівої стінки у верхню, останньої у праву та правої у ліву, що дозволяє розтягнути пазушно-венозний кінець, що зшивають, у вигляді трикутника.
3. Спосіб пластики передньої третини верхньої стрілової пазухи трансплантатом із підшкірної вени верхньої кінцівки за п. 1, який **відрізняється** тим, що послідовно зшивають краї верхньої, правої та лівої стінок венозного колектора з краями аутовенозного трансплантата з почерговим зав'язуванням вузлів однієї нитки кожного лігатурного держака спочатку переднього пазушно-венозного з'єднання, а потім – заднього.