



(la) (lb)

Ar<sub>1</sub> являє собою феніл, який є незаміщеним або заміщеним однією чи кількома групами R<sub>2</sub>;


5. Сполука за пунктом 1, що має формулу



6. Сполука за пунктом 1, що має формулу




7. Сполука за пунктом 1, що має формулу




або її фармацевтично прийнятна сіль.

8. Сполука за пунктом 1, що має формулу




або її фармацевтично прийнятна сіль.

9. Сполука за пунктом 1, що має формулу




або її фармацевтично прийнятна сіль.

10. Сполука формули



або її фармацевтична сіль.

11. Сполука формули



або її фармацевтична сіль.

12. Сполука згідно з будь-яким з пунктів 1 або 5-11 або її фармацевтична сіль для застосування як медикаменту.

13. Композиція, що містить ефективну кількість сполуки або фармацевтично прийнятної солі сполуки за пунктом 1 і фармацевтично прийнятний носій або наповнювач.

14. Композиція за пунктом 13, що додатково містить опіюїдний анальгетик, неопіюїдний анальгетик або протиблювотний засіб.

15. Композиція за пунктом 13, що додатково містить протидіарейний засіб.

16. Спосіб лікування болю у тварини, що включає введення тварині, яка потребує цього, ефективної кількості сполуки або фармацевтично прийнятної солі сполуки за пунктом 1.

17. Спосіб за пунктом 16, який додатково включає введення ефективної кількості опіюїдного анальгетика, неопіюїдного анальгетика або протиблювотного засобу.

18. Спосіб стимуляції опіюїдно-рецепторної функції в клітині, в якому піддають контактуванню клітину, здатну експресувати опіюїдний рецептор, із ефективною кількістю сполуки або фармацевтично прийнятної солі сполуки за пунктом 1.

19. Спосіб за пунктом 18, де рецептор є κ-опіюїдним рецептором, μ-опіюїдним рецептором, δ-опіюїдним рецептором або ORL-1 рецептором.

20. Спосіб одержання композиції, що включає змішування сполуки або фармацевтично прийнятної солі сполуки за пунктом 1 і фармацевтично прийнятного носія або наповнювача.

21. Набір, що включає контейнер, який містить композицію за пунктом 13.

22. Спосіб лікування діареї у тварини, який включає введення тварині, яка потребує цього, ефективної кількості сполуки або фармацевтично прийнятної солі сполуки за пунктом 1.

23. Спосіб за пунктом 22, що додатково включає введення ефективної кількості опіюїдного анальгетика, неопіюїдного анальгетика або протиблювотного засобу.