

1. Застосування харчової добавки, що являє собою пюре з плодів *Carica papaya*, отримуваної способом, що складається з наступних стадій:

варять плоди або роздавлені плоди, зокрема, плоди у протертому вигляді, протягом принаймні 30 хвилин під нормальним тиском, факультативно, з принаймні вдвічі більшим об'ємом водного розчину;

охолоджують зварені плоди або роздавлені плоди протягом принаймні 30 хвилин в атмосфері, що містить кисень;

факультативно, роздавлюють, перемішують та протирають охолоджені плоди або роздавлені плоди до отримання однорідного пюре, для приготування засобу для лікування шлункових розладів.

2. Застосування за п. 1, яке **відрізняється** тим, що стадію варіння проводять протягом принаймні 2 годин.

3. Застосування за п. 1 або 2, яке **відрізняється** тим, що стадію охолодження проводять протягом принаймні 5 годин.

4. Застосування за одним з пп. 1-3, яке **відрізняється** тим, що під час приготування пюре додають лимонну кислоту, переважно у такій кількості, щоб привести рівень рН пюре до 3,5-5,0, зокрема до 3,8-4,4.

5. Застосування за одним з пп. 1-4, яке **відрізняється** тим, що перед варінням плоди *Carica papaya* очищують від шкірки та кісточок.

6. Застосування за одним з пп. 1-5, яке **відрізняється** тим, що отримане пюре пастеризують.

7. Застосування за одним з пп. 1-6, яке **відрізняється** тим, що плоди *Carica papaya* є напівстиглими або стиглими.

8. Застосування за одним з пп. 1-7, яке **відрізняється** тим, що зазначені шлункові розлади вибрані з групи, що складається з хронічного запору, метеоризму та синдрому роз'ятреної товстої кишки.