

Сполука, яку вибирають з однієї або декількох наступних сполук: солі (1R,2S)-2-гідроксіндан-1-аміну та (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти; солі L-аргініну та (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти; солі трет-бутиламіну та (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти; солі холіну та (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти; солі адамантиламіну та (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти; солі N-бензил-2-фенілетанамоніуму та (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти; солі N-бензил-2-(бензиламіно)етанамоніуму та (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти; або сіль трис(гідроксиметил)метиламіну (2S)-2-етокси-3-(4-{2-[гексил(2-фенілетил)аміно]-2-оксоетокси}феніл)пропіонової кислоти.