

1. Використання аскорбінової кислоти або її фізіологічно прийнятної солі для одержання препарату для профілактики та лікування вагінальних грибкових інфекцій, яке **відрізняється** тим, що вказаний препарат призначений для місцевого застосування, і тим, що вказаний препарат вводять після завершення стандартного лікування проти бактеріальних, грибкових чи протозойних інфекцій.
2. Використання за п. 1, де вказаний препарат вводять після завершення стандартного лікування одним або більше антибактеріальними агентами.
3. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказані антибактеріальні агенти вибрані з класів антибактеріальних/антибіотиків, антитрихомонад і/або антигрибкових агентів.
4. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказані антибактеріальні агенти вибрані з міконазолу і метронідазолу.
5. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказаний препарат містить аскорбінову кислоту від 0,1 до 25 %, щодо загальної вагової кількості препарату.
6. Використання за п. 5, де вказаний препарат містить аскорбінову кислоту від 0,5 до 15 %, переважно від 1,0 до 10 %, відносно загальної вагової кількості препарату.
7. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказана грибкова інфекція - рецидивна.
8. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказана грибкова інфекція є суперінфекція.
9. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказана грибкова інфекція викликана *Candida albicans*.
10. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказана аскорбінова кислота - єдиний активний компонент, що містить препарат.
11. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказаний препарат містить загальноновживані наповнювачі і/або ад'юванти.
12. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де препарат містить аскорбінову кислоту у одиничних дозуваннях, придатних для такого застосування, від 10 до 500 мг/день.
13. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказаний препарат знаходиться у формі, придатній для зовнішнього застосування до зовнішніх геніталій, для введення у вагіну.

14. Використання за будь-яким з попередніх пунктів, де вказаний препарат може бути у формі: крему, мазі, гелю, лосьйону або піни для застосування на будь-якій шкірі або для вагінального застосування; крім того, може бути у формі таблеток, вагінального супозиторія, капсул для вагінального застосування; також можливі форми для уповільненого танення, призначеного для пролонгованого вивільнення активного начала.