

1. Застосування інгібітору ІЛ-18, що вибраний з антитіла проти ІЛ-18 і ІЛ-18-зв'язуючого білка, або ізоформ, мутеїнів, злитих білків, функціональних похідних, активних фракцій або похідних із циклічною перестановкою, що мають по суті таку ж активність, як і ІЛ-18-зв'язуючий білок, для виготовлення лікарського засобу для лікування і/або попередження алкогольного гепатиту.
2. Застосування за п. 1, де антитіло до ІЛ-18 являє собою гуманізоване антитіло до ІЛ-18.
3. Застосування за п. 1, де антитіло до ІЛ-18 являє собою антитіло до ІЛ-18 людини.
4. Застосування за п. 1, де ІЛ-18-зв'язуючий білок оброблений поліетиленгліколем.
5. Застосування за п. 1, де інгібітор ІЛ-18 являє собою злитий білок, що містить весь ІЛ-18-зв'язуючий білок або його частину, злитий з усім імуноглобуліном або його частиною, і де злитий білок зв'язується з ІЛ-18.
6. Застосування за п. 5, де злитий білок містить всю константну ділянку імуноглобуліну або її частину.
7. Застосування за п. 6, де імуноглобулін є ізотипом IgG1 або IgG2.
8. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де лікарський засіб містить також інтерферон.
9. Застосування за п. 8, де інтерферон являє собою інтерферон- β .
10. Застосування за п. 8 або 9, де інгібітор ІЛ-18 застосовується одночасно, послідовно або окремо від інтерферону.
11. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де лікарський засіб містить також антагоніст фактора некрозу пухлини (TNF).
12. Застосування за п. 11, де антагоніст TNF являє собою ТВРІ і/або ТВРІІ.
13. Застосування за п. 11 або 12, де інгібітор ІЛ-18 і/або інтерферон застосовується одночасно, послідовно або окремо від антагоніста TNF.
14. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де лікарський засіб містить також інгібітор COX.
15. Застосування за п. 14, де інгібітор COX являє собою інгібітор COX-2.
16. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де інгібітор ІЛ-18 застосовується в кількості приблизно 0,4-4 мг на кг маси тіла.
17. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де інгібітор ІЛ-18 застосовується в кількості приблизно 1 мкг на кг маси тіла.
18. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де інгібітор ІЛ-18 вводять підшкірно.
19. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де інгібітор ІЛ-18 вводять внутрішньом'язово.

20. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де інгібітор ІЛ-18 вводять щодня.
21. Застосування за будь-яким з попередніх пунктів, де інгібітор ІЛ-18 вводять через день.
22. Застосування експресуючого вектора, що містить кодуючу послідовність ІЛ-18-зв'язуючого білка, для виготовлення лікарського засобу для лікування і/або попередження алкогольного гепатиту.
23. Застосування за п. 22 для генної терапії.
24. Застосування клітини, генетично модифікованої для продукування ІЛ-18-зв'язуючого білка, при виготовленні лікарського засобу для лікування і/або попередження алкогольного гепатиту.