

1. Спосіб лікування суб'єкта, що страждає на надмірну сонливість у денний час, пов'язану з нарколепсією, нападами апное уві сні або міопатією, згідно з яким суб'єкту вводять терапевтично ефективну кількість форми V R-(-)-модафінілу, де форма V R-(-)-модафінілу характеризується порошковою рентгенограмою, яка включає піки, що відповідають наступним значенням кутів 2-тета:

- (a) 6,61, 10,39 і 16,49 градусів;
- (b) 6,61 і 10,39 градусів;
- (c) 13,99 і 17,73 градусів;
- (d) 20,87 і 22,31 градусів; або
- (e) 6,61 градуса.

2. Спосіб за п. 1, де надмірна сонливість у денний час пов'язана з нарколепсією або нападами апное уві сні.

3. Спосіб лікування суб'єкта, що страждає на розлад, який виражається в гіперактивності, що приводить до порушення уваги (ADHD), згідно з яким суб'єкту вводять терапевтично ефективну кількість форми V R-(-)-модафінілу, де форма V R-(-)-модафінілу характеризується порошковою рентгенограмою, яка включає піки, що відповідають наступним значенням кутів 2-тета:

- (a) 6,61, 10,39 і 16,49 градусів;
- (b) 6,61 і 10,39 градусів;
- (c) 13,99 і 17,73 градусів;
- (d) 20,87 і 22,31 градусів; або
- (e) 6,61 градуса.

4. Фармацевтична композиція, що включає форму V R-(-)-модафінілу, де форма V R-(-)-модафінілу характеризується порошковою рентгенограмою, яка включає піки, що відповідають наступним значенням кутів 2-тета:

- (a) 6,61, 10,39 і 16,49 градусів;
- (b) 6,61 і 10,39 градусів;
- (c) 13,99 і 17,73 градусів;
- (d) 20,87 і 22,31 градусів; або
- (e) 6,61 градуса.