

1. Застосування 3-Z-[1-(4-(N-((4-метилпіперазин-1-іл)метилкарбоніл)-N-метиламіно)аніліно)-1-фенілметиле́н]-6-метоксикарбоніл-2-індоліно́ну або моноетансульфонатної солі цієї сполуки для приготування лікарського засобу, призначеного для попередження або лікування ідіопатичного фіброзу легенів.

2. Застосування за п. 1, у якому лікування є комбінованим лікуванням з використанням додаткової фармакологічно активної речовини, вибраної із групи, яка включає антихолінергічні засоби, бета-2 міметики, стероїди, інгібітори PDE-IV, інгібітори p38 MAP кінази, антагоністи NK₁, антагоністи LTD4, інгібітори EGFR і антагоністи ендотеліну.

3. Фармацевтична композиція, яка містить 3-Z-[1-(4-(N-((4-метилпіперазин-1-іл)метилкарбоніл)-N-метиламіно)аніліно)-1-фенілметиле́н]-6-метоксикарбоніл-2-індоліно́н або моноетансульфонатну сіль цієї сполуки у комбінації з додатковою фармакологічно активною речовиною, вибраною із групи, яка включає антихолінергічні засоби, бета-2 міметики, інгібітори PDE-IV, інгібітори p38 MAP кінази, антагоністи NK₁, антагоністи LTD4 і антагоністи ендотеліну, необов'язково разом з одним або більшою кількістю фармацевтично прийнятних носіїв або інертних наповнювачів.