

1. Спосіб лікування захворювань колінного суглоба, що включає згинально-розгинальні рухи колінного суглоба за віссю згинання, **який відрізняється тим**, що здійснюють вібровплив по черзі на гомілковостопний та колінний суглоби ураженої нижньої кінцівки частотою 23-25 Гц та амплітудою 4 мм, одночасно з цим проводять згинально-розгинальні рухи колінного суглоба за віссю згинання, при цьому дискретно вводять пері- та інтраартикулярно дипроспан з новокаїном у порожнину колінного суглоба, потім накладають компрес на уражений колінний суглоб із суміші компонентів при наступному співвідношенні, мас. %:

димексид - 25,0

0,5% розчин новокаїну - 25,0

бішофіт - 25,0

сік алое - 25,0.

2. Спосіб за п.1, **який відрізняється тим**, що курс лікування включає 12-15 щоденних лікувальних сеансів.

3. Спосіб за п. 1, **який відрізняється тим**, що дипроспан з новокаїном вводять при проведенні 1, 6 і 12 лікувальних сеансів.

4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, **який відрізняється тим**, що дипроспан вводять у кількості 1 мл у комбінації з 5 мл 0,5% розчину новокаїну.

5. Спосіб за п.1, **який відрізняється тим**, що компрес накладають на уражений колінний суглоб щоденно протягом усього курсу лікування.