

1. Спосіб корекції і профілактики патологічних станів, що включає пред'явлення пацієнту оптичних стимулів, визначення реакцій пацієнта на оптичні стимули, зіставлення реакцій пацієнта на оптичні стимули з відомим переліком реакцій при даному патологічному стані, вибір коригуючих або профілактичних впливів, або їх різноманітних сполучень на основі результатів указанного зіставлення, який **відрізняється** тим, що пред'явлені пацієнту оптичні стимули розташовують за межами центру перцептивного зорового або рецептивного простору або за межами центральної ділянки сітківки, виконують діагностичний вплив на організм і/або психіку пацієнта, повторно пред'являють оптичні стимули після діагностичного впливу на організм і/або психіку пацієнта, визначають реакцію пацієнта на повторно пред'явлені оптичні стимули, зіставляють реакції пацієнта на оптичні стимули до і після діагностичного впливу на організм і/або психіку пацієнта з відомим переліком реакцій при даному патологічному стані, а вибір коригуючих або профілактичних впливів, або їхніх різноманітних сполучень виконують з урахуванням указанного зіставлення .
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що розташування оптичних стимулів за межами центру перцептивного зорового або рецептивного простору, або за межами центральної ділянки сітківки пропонують виконати пацієнту шляхом самостійного формування перцептивних зорових або рецептивних просторів.
3. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що розташування оптичних стимулів за межами центру перцептивного зорового або рецептивного простору, або за межами центральної ділянки сітківки здійснюють шляхом формування заданих перцептивних зорових або рецептивних просторів, які пропонують пацієнту.