


1. Сполука формули (I):



або її фармацевтично прийнятна сіль.

2. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її застосовують як лікарський засіб.

3. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для лікування хворобливого стану, при якому показаний антагоніст  $\alpha_V\beta_3$  рецептора.

4. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для лікування хворобливого стану, при якому показаний антагоніст  $\alpha_V\beta_5$  рецептора.

5. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для лікування остеопорозу.

6. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для інгібування ангиогенезу.

7. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для інгібування росту пухлини або метастази пухлини.

8. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для лікування атеросклерозу або рестенозу.

9. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для лікування запалення.

10. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують для одержання лікарського засобу для інгібування росту пухлини.

11. Сполука формули (I) за п.1, яка відрізняється тим, що її використовують разом з інгібітором розсмоктування кісткової тканини для одержання лікарського засобу для лікування остеопорозу.


12. Фармацевтична композиція, яка відрізняється тим, що містить сполуку, вказану в п. 1, та фармацевтично прийнятний носій.

13. Фармацевтична композиція, яка відрізняється тим, що містить сполуку, вказану в п. 1, протипухлинний агент та фармацевтично прийнятний носій.

14. Фармацевтична композиція за п. 13, яка відрізняється тим, що протипухлинним агентом є топотекан.


15. Фармацевтична композиція за п. 13, яка відрізняється тим, що протипухлинним агентом є цисплатин.

16. Сполука формули (II):



або її фармацевтично прийнятна сіль.

17. Спосіб одержання сполуки формули (I) за п.1, який відрізняється тим, що вказаний спосіб здійснюють шляхом взаємодії сполуки формули (III):



з 2-(5,6,7,8-тетрагідро-1,8-нафтиридин-2-іл)-1-етанолом у реакції, що протікає під дією комплексу, утвореного діізопропілазодикарбоксилатом та трифенілфосфіном, з наступним складноефірним гідролізом при використанні водяної основи.