

Спосіб якісної діагностики прогресування остеоартрозу колінних суглобів, який включає рентгенологічне дослідження колінного суглоба в передньо-задній проекції в позиції стоячи з навантаженням власною вагою, який **відрізняється** тим, що на рентгенограмі зігнутого під кутом 129° - 132° колінного суглоба в передньо-задній проекції при відсутності звуження суглобової щілини діагностують нульовий ступінь прогресування, при незначному локальному звуженні медіально або латерально - перший ступінь, незначному тотальному або значному локальному звуженні медіально або латерально - другий ступінь, значному тотальному звуженні - третій ступінь, при відсутності остеофітозу діагностують нульовий ступінь, при наявності 1-2 дрібних остеофітів - перший ступінь, трьох та більше дрібних або поодинокого великого остеофітів - другий ступінь, двох та більше великих остеофітів - третій ступінь, при відсутності остеосклерозу діагностують нульовий ступінь прогресування, при наявності незначного локального остеосклерозу медіально або латерально - перший ступінь, незначного поширеного або значного локального - другий ступінь, значного поширеного - третій ступінь, при відсутності остеокістозу діагностують нульовий ступінь прогресування, при наявності 1-2 дрібних кіст - перший ступінь, трьох та більше дрібних або поодинокій великій кіст - другий ступінь, двох та більше великих кіст - третій ступінь.