

Спосіб якісної діагностики прогресування остеоартрозу колінних суглобів включає рентгенологічне дослідження колінного суглоба в передньо-задній проекції в позиції стоячи з навантаженням власною вагою. На рентгенограмі зігнутого під кутом 129° - 132° колінного суглоба в передньо-задній проекції при відсутності звуження суглобової щілини діагностують нульовий ступінь прогресування. При незначному локальному звуженні медіально або латерально - перший ступінь. Незначному тотальному або значному локальному звуженні медіально або латерально - другий ступінь. Значному тотальному звуженні - третій ступінь. При відсутності остеофітозу діагностують нульовий ступінь. При наявності 1-2 дрібних остеофітів - перший ступінь, трьох та більше дрібних або поодинокого великого остеофітів - другий ступінь, двох та більше великих остеофітів - третій ступінь. При відсутності остеосклерозу діагностують нульовий ступінь прогресування. При наявності незначного локального остеосклерозу медіально або латерально - перший ступінь. Незначного поширеного або значного локального - другий ступінь. Значного поширеного - третій ступінь. При відсутності остеокістозу діагностують нульовий ступінь прогресування. При наявності 1-2 дрібних кіст - перший ступінь, трьох та більше дрібних або поодинокі великі кісти - другий ступінь, двох та більше великих кіст - третій ступінь.