

Спосіб лікування розладів ерекції, який включає застосування лікарських препаратів, що сприяють накопиченню в кавернозній тканині циклічного гуанозинмонофосфату, який **відрізняється** тим, що накопичення циклічного гуанозинмонофосфату забезпечують підсиленням його вироблення шляхом впливу на синтез монооксиду азоту за допомогою введення:

розчину L-лізину есцинату - 3-10 мл внутрішньовенно (1 мл розчину містить 0,001 г препарату) 1 раз на добу,

розчину унітіолу 5 % - 2,5-5 мл внутрішньом'язово через день,

розчину рибофлавінмононуклеотиду 1 % - 1,0-2,0 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу,

розчинів рибоксину 2 % - 1,0-2,0 мл та нікотинової кислоти 0,1 % - 0,5-1,5 мл у суміші внутрішньокавернозно 2-4 рази на тиждень,

відеїну - 1 таблетка (0,15 г препарату) 3-4 рази на добу,

фероплекту - 2 драже (в 1 драже - 0,05 г сульфату заліза та 0,03 г аскорбінової кислоти) 3 рази на добу,

глутамінової кислоти - 2 таблетки (1 таблетка містить 0,25 г препарату) 4 рази на добу, тритижневим курсом застосування, що забезпечить покращення власної ерекції і дозволить вести повноцінне статеве життя.