

1. Спосіб лікування сухості піхви або статевої дисфункції у жінок під час або після менопаузи, причому вказаний спосіб включає введення жінці ефективної кількості сполуки (деаміногідрокси)тореміфену або його фармацевтично прийнятної солі, або складного ефіру, або метаболіту.
2. Спосіб за п. 1, в якому сполуку або її сіль, або складний ефір вводять в добовій дозі, що варіює в діапазоні від 25 до 100мг.
3. Спосіб за п. 2, в якому сполуку або її сіль, або складний ефір вводять в добовій дозі, що варіює в діапазоні від 30 до 90мг.
4. Спосіб за будь-яким з пп.1-3, в якому сполуку або її сіль, або складний ефір вводять перорально або трансдермально.
5. Застосування сполуки (деаміногідрокси)тореміфену або його фармацевтично прийнятної солі, або складного ефіру, або метаболіту для виготовлення фармацевтичної композиції для лікування сухості піхви або статевої дисфункції у жінок під час або після менопаузи.
6. Застосування за п. 5, при якому сполуку або її сіль, або складний ефір вводять в добовій дозі, що варіює в діапазоні від 25 до 100мг.
7. Застосування за п. 6, при якому сполуку, або її сіль або складний ефір вводять в добовій дозі, що варіює в діапазоні від 30 до 90мг.
8. Застосування за будь-яким з пп. 5-7, при якому сполуку або її сіль, або складний ефір вводять перорально або трансдермально.