



УКРАЇНА

(19) UA (11)

7485

(13) C1

(51)5 A 61 H 7/00

ДЕРЖАВНЕ  
ПАТЕНТНЕ  
ВІДОМСТВООПИС ДО ПАТЕНТУ  
НА ВІНАХІД(54) КОНТАКТНИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПРОСТОГО ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОГО ЛІКТЬОВОГО  
БУРСИТУ ПО МЕТОДИЦІ М.І.ШПОРТЮК

1

(21) 93101208

(22) 21.12.92

(46) 29.09.95. Бюл. № 3

(56) Горячев А.Н., Иващенко Н.Н.,  
Потапов Ю.А. Лечение хронических бурситов методом локального криовоздействия. Вестник хирургии им. И.И.Грекова. – М.: Медицина, 88, № 1, с. 128.

(71) Шпортюк Марія Іванівна

(72) Шпортюк Марія Іванівна

(73) Шпортюк Марія Іванівна (UA)

2

(57) Контактный способ лечения простого посттравматического локтевого бурсита путем воздействия холодом. Отличающийся тем, что сначала осуществляют поглаживание опухоли от локтевого сустава вверх в течение 2-3 мин, а затем охлаждают эту область водой с температурой до 3°C или снегом в течение 2-3 сек, увеличивают время поглаживания при повторных сеансах на 0.5 мин, доводя его до 5 мин, всего на курс 4-6 сеансов.

Изобретение относится к области медицины, в частности к способам лечения простого бурсита после ушиба

Известен способ лечения хронических бурситов методом локального криовоздействия с помощью аппарата "Криоэлектроника-2". Однако, этот способ используется для лечения только хронических бурситов, длителен, требует сложного оборудования и медикаментов.

Задачей изобретения является создание безмедикаментозного контактного способа лечения простого посттравматического локтевого бурсита, который за счет сочетания холодовых процедур и мануальных воздействий, а также определенного времени воздействия, позволил бы сократить сроки лечения.

Поставленная задача решается тем, что образовавшуюся опухоль сразу после ушиба или позже мягко, не надавливая, поглаживают всеми пальцами руки в течение 2-3 минут в одном направлении – вверх (к плечу), выходят и за пределы опухоли на 0.5-2 см, причем большая нагрузка приходится на

безымянный и средний пальцы, после каждого физического воздействия на опухоль наносят холод – воду с температурой +3°C, или снег в течение 2-3 сек, при повторных сеансах время поглаживания увеличивают на 0.5 мин., доводя его до 5 мин.

Курс лечения – 4-6 дней позволяет вылечить бурсит локтевого сустава после ушиба без патологий и медикаментов.

Пример. Больная Ш., 59 лет, в области локтя обнаружена опухоль до 2-х см в диаметре, наполненная жидкостью. Диагноз: бурсит правого локтевого сустава. Опухоль с ровными и четкими границами, то ее мягко, не надавливая поглаживают всеми пальцами руки в течение 2-3 мин, но большая нагрузка приходится на средний и безымянный пальцы, совершают воздействие только в одном направлении вверх (к плечу по ходу мышечно-нервов), выходят и за ее пределы на 1.5-2 см с последующим воздействием холода в течение 2-3 сек (снег или х/вода) и после восстанавливают биополе (дуют 3 раза). При повторных сеансах время воздейст-

(19) UA (11) 7485 (13) C1

вия увеличивают на 0,5 мин. доводя его до 5 мин. По величине, длине опухоли и плотности кожи заявитель определяет время воз-

действия контактным способом и длительность лечения. Курс лечения не более 4-6 дней

Упорядник М.Шпортюк

Техред М.Моргентал

Коректор Л. Пилипенко

Замовлення 4519

Тираж

Підписне

Державне патентне відомство України,  
254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8

Виробничо-видавничий комбінат "Патент", м. Ужгород, вул.Гагаріна, 101