

1. Способ лечения гепатита, включающий сеансы магнитолазеротерапии, **отличающийся** тем, что в каждом сеансе проводят импульсную магнитотерапию корешков спинного мозга паравертебрально на уровне **D9-D10**, сканирование гелий-неоновым лазерным излучением области проекции печени, воздействие инфракрасным лазерным излучением на биологически-активные точки в области печени, КВЧ-терапию биологически-активных точек, специфичных для печени, электропунктуру биологически-активных точек ушной раковины, периодически, 4 - 5 раз за курс, проводят сеансы внутривенной лазеротерапии.

2. Способ по п.1, **отличающийся** тем, что импульсную магнитотерапию проводят частотой 30имп./мин., напряженностью магнитного поля 0,7Тл, в течение 6 минут с каждой стороны, сканируют гелий-неоновым излучением мощностью 10 - 15мВт в течение 20мин, КВЧ-терапия мощностью 10мВт, в каждом сеансе воздействуют на одну-две парные биологически-активные точки из ряда **F-13, F-14, J-12, F-2, F-3, VB- 34, VB-41, E-36**, общее время воздействия 30 - 40 минут, инфракрасную лазеротерапию, проводят на точки **F-13, F-14, V-12, V-13** одновременно в непрерывном, мощностью 40мВт, и импульсном, мощность 5Вт, режимах, в течение 2мин, на область, электропунктуру током отрицательной полярности, величиной 15 - 20мкА по биологически-активным точкам ушной раковины шэнь-мэнь, симпатическая, надпочечники, печень, желчный пузырь, время воздействия 10 - 20сек. на точку, внутривенная гелий-неоновая терапия мощностью 2мВт в течение 15 - 20мин.