

1. Основа для гелей, содержащая сополимер акриловой кислоты, гидрофильный растворитель, спирт этиловый, нейтрализующий агент и воду, **отличающаяся** тем, что она дополнительно содержит формальдегид, качестве гидрофильного растворителя содержит пропиленгликоль и/или глицерин, а в качестве нейтрализующего агента -15-25% водный раствор аммиака при следующем соотношении компонентов. мас. %:

сополимер	акриловой	0,60 – 1,70
кислоты		
пропиленгликоль	и/или	4,50 - 9,00
глицерин		
спирт этиловый		5,00 -10,00
15-25% водный	раствор	0,25 - 0,85
аммиака		
формальдегид		0,08 - 0,12
вода очищенная	или	остальное.
питьевая		

2. Основа для гелей по п. 1, **отличающаяся** тем, что в качестве сополимера акриловой кислоты используют карбопол или с акал, или акмпд, или аксам.

3. Основа для гелей по 1 или 2, **отличающаяся** тем, что может дополнительно содержать отдушку в количестве до 0,1% и/или краситель тропеолин, или кислотный красный, или индигокармин в количестве до 0,01%.

4. Основа для гелей по п. 1 или 2, или 3, **отличающаяся** тем, что может дополнительно содержать экстракты лекарственных растений. выбранных из группы, включающей зверобой, полынь, ромашку, череду, Melissa, девясил, чистотел, лycopодий, алоэ, шиповник, лаванду, мяту перечную, шалфей в количестве до 0,6 %.