

1. Застосування фумагілолу або складного ефіру фумагілолу з (C₁-C₁₂) алкілкарбоною або (C₁ - C₁₂) алкілдикарбоною кислотою , насиченою або ненасиченою, та їх фармацевтичне прийнятних солей як активної речовини для одержання ліків, призначених для боротьби з кишковими інфекціями, викликаними мікроспорами та / або криптоспорами.
2. Застосування за п.1, яке **відрізняється** тим, що зазначений вище складний ефір представляє собою фумагілін.
3. Застосування за п.1, яке **відрізняється** тим, що ліки призначені для боротьби з кишковими інфекціями, основним збудником яких є Enterocytozoon bieneusi.
4. Застосування за п.3, яке **відрізняється** тим, що зазначений вище складний ефір представляє собою фумагілін.
5. Застосування за п.1 або 2, яке **відрізняється** тим, що ліки призначені для орального введення.
6. Застосування за п.3 або 4, яке **відрізняється** тим, що ліки представляють собою таблетки, желатинові капсули або таблетки пролонгованої дії, або таблетки з контрольованим виділенням.
7. Фармацевтична композиція для боротьби з кишковими інфекціями , викликаними мікроспорами та/ або криптоспорами, яка призначена для орального введення , яка характеризується тим, що як активну речовину вона містить складний ефір фумагілолу з (C₁ – C₁₂) алкілдикарбоною кислотою, насиченою або ненасиченою, або одну з її фармацевтичне прийнятних солей і, принаймні, один фармацевтично прийнятний ексципієнт та/ або носій.
8. Фармацевтична композиція за п.7, яка **відрізняється** тим, що зазначений вище складний ефір представляє собою фумагілін.
9. Фармацевтична композиція за п.7 або 8, яка **відрізняється** тим, що вона містить 1 - 200 мг активної речовини в одиничній дозі.
10. Фармацевтична композиція за п. 9, яка **відрізняється** тим, що вона містить 7,5 - 30 мг активної речовини в одиничній дозі.