

1. Лікарський препарат, що включає діючі речовини каптоприл, гідрохлоротіазид і допоміжні компоненти крохмаль, цукор молочний, магнію стеарат, який **відрізняється** тим, що як допоміжні компоненти уведені полівінілпіролідон, аеросил при наступному співвідношенні компонентів, г:

Каптоприл	0,04625-0,05375
Гідрохлортіазид	0,0231-0,0269
Молочний цукор	0,0749-0,0871
Магнію стеарат	0,00185-0,00215
Крохмаль	0,037-0,043
Аеросил	0,0004625-0,0005375
Полівінілпіролідон	0,0013875-0,0016125.

2. Спосіб виробництва лікарського препарату, що включає змішування діючої речовини з допоміжними компонентами, які включають крохмаль, цукор молочний, зволоження, вологу грануляцію, сушіння гранулята, сухе гранулювання, обпудрювання гранулята, таблетування, який **відрізняється** тим, що як діючі речовини вводять каптоприл, гідрохлортіазид, як зволожувач вводять полівінілпіролідон, при цьому каптоприл змішують з аеросилом, гідрохлортіазидом, а потім масу зволожують.

3. Спосіб за п.2, який **відрізняється** тим, що перед змішуванням компоненти просівають.

4. Спосіб за будь-яким з пп. 2-3, який **відрізняється** тим, що просівання при цьому здійснюють обертально-вібраційним способом.

5. Спосіб за будь-яким з пп.2-4, який **відрізняється** тим, що перед зволоженням компоненти перемішують протягом 8-12 хвилин.

6. Спосіб за будь-яким з пп.2-5, який **відрізняється** тим, що зволожену масу перемішують протягом 5-15 хвилин.

7. Спосіб за будь-яким з пп.2-6, який **відрізняється** тим, що сушіння гранулята проводять при температурі 40-45°C.

8. Спосіб за будь-яким з пп.2-7, який **відрізняється** тим, що сушіння гранулята проводять протягом 30-40 хвилин.

9. Спосіб за будь-яким з пп.2-8, який **відрізняється** тим, що сушіння гранулята проводять у завислому шарі.

10. Спосіб за будь-яким з пп.2-9, який **відрізняється** тим, що гранулят обпудрюють сумішшю магнію стеарату і подрібнених некондиційних таблеток.

11. Спосіб за будь-яким з пп.2-10, який **відрізняється** тим, що при сухому гранулюванні й обпудрюванні вміст перемішують протягом 8-12 хвилин.

12. Спосіб за будь-яким з пп.2-11, який **відрізняється** тим, що після таблетування таблетки знепилюють.